

Сверхпродолжительное антибактериальное
средство для лечения инфекций органов дыхания

ПУЛЬМАПРИМ

В 1 мл содержится: тулатромицин – 100 мг и вспомогательные вещества

**ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ –
МОЩНЫЙ ЭФФЕКТ!**

действие до 15 дней



Внешний вид упаковки препарата
может отличаться от изображения



- **ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ В ТКАНЯХ ЛЕГКИХ**
- **ШИРОКИЙ СПЕКТР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ**
- **ОДНОКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**
- **ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ БАКТЕРИЙ И МИКОПЛАЗМ**
- **СНИЖЕНИЕ ВЫБИТИЯ И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ИНФЕКЦИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ**



Сверхпродолжительное антибактериальное средство для лечения инфекций органов дыхания

ПУЛЬМАПРИМ

ПУЛЬМАПРИМ – препарат первого выбора (группы макролидов) для защиты КРС и свиней от респираторных болезней. За счет применения препарата Пульмаприм можно существенно сократить количество используемых противомикробных средств, т.к. значительно снижается риск повторного заболевания.

Коэффициент риска повторного заболевания при использовании препаратов для лечения респираторных болезней КРС







Диаграмма построена на основе анализа 98 исследований, ключевым параметром которых стала оценка частоты возникновения повторных заболеваний в течение 28 дней после окончания лечения.


ПОКАЗАНИЯ Пульмаприм применяют с лечебной целью:


 **КРС** при бактериальных инфекциях органов дыхания, вызываемых Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus и Mycoplasma bovis, и инфекционном кератоконъюнктивите, вызываемом Moraxella bovis и Neisseria spp.;

 **Свиньям** при бактериальных инфекциях органов дыхания, вызываемых Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis, Mycoplasma huor pneumoniae и Bordetella bronchiseptica.



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

 **КРС** однократно подкожно в дозе 1 мл на 40 кг массы животного (2,5 мг тулатромицина на 1 кг живой массы). При назначении крупному рогатому скоту, масса тела которого превышает 300 кг, дозу разделяют таким образом, чтобы объем, вводимый в одну точку, не превышал 7,5 мл.

 **Свиньям** однократно внутримышечно в области шеи в дозе 1 мл на 40 кг массы животного (2,5 мг тулатромицина на 1 кг живой массы). При назначении свиньям, масса тела которых превышает 80 кг, дозу разделяют таким образом, чтобы объем, вводимый в одну точку, не превышал 2 мл.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ Убой КРС на мясо – не ранее, чем через 49 суток, свиней – не ранее, чем через 33 суток после последнего применения препарата.

Запрещается применять дойным коровам; стельным коровам и телкам менее чем за 2 месяца до предполагаемого начала лактации (отела).



Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения